

Un fongicide aux modes d'action multiples, qui supprime plusieurs maladies importantes du gazon tout en procurant les avantages de la technologie Intrinsic^{MC} pour la santé des plantes.¹


- Jusqu'à 28 jours de suppression de plus de vingt maladies du gazon, y compris l'antracnose, la plaque brune, la plaque estivale, la plaque nivéale (fusarienne) et la brûlure en plaques
- Maîtrise de la brûlure en plaques grâce à ses multiples modes d'action.
- **Avantages exclusifs Intrinsic pour la santé des plantes¹**, qui aident à surmonter les stress environnementaux et mécaniques².

Ingrédients actif Pyraclostrobine – groupe 11 Boscalide – groupe 7	Culture Gazon	Calendrier d'application³ Appliquer de manière préventive, lorsque les conditions favorisent le développement des maladies.
Maladies maîtrisées Anthracnose (<i>Colletotrichum cereale</i>) Brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homeocarpa</i>) Brûlure instantanée (<i>Labyrinthula terrestris</i>) Brûlure pythienne (<i>Pythium aphanidermatum</i>) Brunissure annulaire (<i>Rhizoctonia circinata</i> var. <i>circinata</i>) Cercle de fée/rond de sorcière (<i>Basidiomycete fungi</i>) Dysfonctionnement racinaire pythien (<i>Pythium volutum</i> , <i>Pythium arrhenomanes</i> , <i>Pythium aristosporum</i>) Fonte (<i>Drechslera poae</i>) Fil rouge (<i>Laetisaria fuciformis</i>) Moisissure grise des neiges (<i>Typhula incarnata</i> , <i>T. ishikariensis</i>) Moisissure rose des neiges (<i>Microdochium nivale</i>) Oïdium (<i>Erysiphe graminis</i>) Piétin-échaudage (<i>Gaeumannomyces graminis</i>) ⁴ Plaque brune (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>zeae</i>) Plaque estivale (<i>Magnaporthe poae</i>) Plaque nivéale (fusarienne) (<i>Microdochium patch</i>) Rhizoctonie du feuillage ou de la gaine (<i>R. oryzae</i> , <i>R. zea</i>) Rouille (<i>Puccinia</i> spp.) Taches foliaires (<i>Drechslera</i> spp., <i>Bipolaris</i> spp.) Tache grise (<i>Pyricularia grisea</i>) Tache nécrotique de l'agrostide (<i>Ophiophaerella agrostis</i>)		
<small>¹ Les avantages pour la santé des plantes concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobine. ² Toutes les comparaisons sont par rapport à des cultures non traitées, à moins d'indication contraire. ³ Consulter l'étiquette pour plus de détails sur le calendrier de traitement et les restrictions. ⁴ Répression seulement.</small>		



We create chemistry

Maîtrise de la brûlure pythienne couplée aux Avantages Intrinsic pour la santé des plantes¹



Les traitements ont été appliqués de manière préventive à intervalles de 7 jours.

Source : Les résultats sont les données combinées des essais de l'Université de Penn State, de l'Université du Wisconsin et de Virginia Tech, 2004.

Maîtrise de la brûlure estivale couplée aux avantages Intrinsic pour la santé des plantes¹



Source : BASF et recherche d'une tierce partie

Doses d'emploi⁵

Un contenant du fongicide Honor^{MD} traite de 5 à 8 hectares (12 à 20 acres).

Culture

Gazon

Dose d'emploi

1,83 à 3,5 kg/ha (18,3 à 35 g/100 m²) en fonction de la maladie

⁵ Voir l'étiquette pour les doses et les restrictions propres à chaque maladie.

Séquence des mélanges

1. S'assurer que le réservoir du pulvérisateur est propre avant l'utilisation.
2. Remplir le réservoir à moitié d'eau et démarrer l'agitation.
3. Ajouter la quantité requise de fongicide Honor au réservoir tout en agitant.
4. Ajouter la quantité requise du partenaire de mélange, si requis.
5. Remplir le reste du réservoir tout en continuant d'agiter.
6. Après l'utilisation, nettoyer le réservoir conformément aux directives de l'étiquette.

Conseils pour l'application

Résistance au délavage par la pluie – 1 heure

Délai de sécurité après traitement – Lorsque le résidu est sec

Gestion de la résistance – Afin de réduire le risque de développement d'une résistance aux fongicides, respecter les instructions de l'étiquette concernant l'utilisation consécutive du fongicide Honor ou des fongicides du groupe 7 ou 11 qui ont un site d'action similaire sur les mêmes agents pathogènes. Ne pas dépasser le nombre total d'applications séquentielles recommandées de Honor. Ne pas dépasser (4) quatre applications par saison.

Additifs

Ne pas utiliser avec des adjuvants à base d'organosilicates, sous peine d'endommager le gazon. En raison du grand nombre d'additifs ou d'adjuvants susceptibles d'être utilisés, ni le fabricant ni le vendeur n'ont déterminé si le fongicide Honor pouvait être utilisé en toute sécurité avec tous les additifs.

Mélanges en réservoir

Communiquez avec votre représentant local Gazon BASF pour plus d'information sur les mélanges en réservoir approuvés.

Pour plus d'information :

Communiquez avec votre représentant gazon BASF ou visitez le **betterturf.ca/fr**

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette,

HONOR et INTRINSIC sont des marques déposées de BASF; toutes utilisées sous licence par BASF Canada Inc. Les fongicides HONOR et/ou INTRINSIC devraient être utilisés dans le cadre d'un programme de lutte préventive contre les maladies. © 2024 BASF Canada Inc.

SEGWAY est une marque de commerce d'Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.